



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

CIMMYT
International Maize and Wheat Improvement Center



Agricultural Innovation Program (AIP) for Pakistan

AIP-Livestock: Fact Sheet no: 02

نوزائیدہ چھڑوں کی دیکھ بھال

ناف کی صفائی تب تک کریں جب تک یہ خشک ہو کر نہ جائے اس میں تقریباً (10) دن لگیں گے۔

آئیو ڈین کا کمزور محلول (10-7 فیصد) کھلمنہ والے برتن میں ڈال کر ناف اس میں ڈوبیں۔

How to recognize a sick calf: پیچڑے کی پہچان:

چھڑے کے باقاعدگی سے مشاہدے میں چندا ہم باتوں کا خیال رکھیں۔

☆ پیچڑے کا ناک ہمیشہ خشک ہوتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔

☆ چھڑے کے سانس لینے کے عمل کو بغور سنیں اور دیکھ لیں کہ سانس لینے میں دشواری تو نہیں۔

☆ چھڑے کی ذم کو دیکھ لیں کہ اس پر خون اگور تو نہیں۔

☆ اسکی ناگیں اور پاؤں دیکھنا۔ پہلے 7 سے 10 دن کی عمر تک اسکی ناف پر سوزش کی علامات یا سوجن کا معائنہ کریں۔

چھڑے کو خشک کرنا (Dry the calf)

تیز ہوا والے ماحول میں گیلیے چھڑے کو جلدی سردی یا بیماری لگ سکتی ہے۔ پیدائش کے وقت صاف سوکھی گھاس کو صفائی کیلئے استعمال کر سکتے ہیں۔

چھڑے کی پہچان کرنا (Identify the calf)

نوزائیدہ چھڑے کی شناخت کا مستقل طریقہ اپنائیں پیدائش کا ریکارڈ مستقل بنیادوں پر اور اچھے طریقے سے رکھیں۔ اور ہر ایک کی پہچان کے لئے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔

☆ پلاسٹک ٹیگ کانوں میں لگانا۔


☆ گردن کے گرد ہار پہنانا جس پر نمبر لکھے ہوں۔

☆ جسم کو شنڈلے طریقے سے داغنا۔

نوزائیدہ چھڑوں کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کرنے کے عمل میں مثلاً بہتر خوراک، کھڑے رہنے کی جگہ، بہتر صفائی، بیماریوں سے روک تھام اور باقاعدگی سے روزانہ مشاہدہ کرنا شامل ہیں۔

اس توسیعی مواد میں تندرست چھڑوں کی پیدائش سے لیکر دودھ چھڑوانے کے عرصے تک پرورش اور دیکھ بھال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

Remember!!!
Calf today is your Cow tomorrow!



(یاد رکھیے آج کا چھڑا کل کی گائے ہے)

پیدائش کے پہلے گھنے کے اندر:

پیدائش کے بعد اس امر کو یقینی بنائیں کہ چھڑا سانس لے رہا ہے۔

سانس لینے میں دشواری عموماً تب آتی ہے جب پیدائش میں مشکل پیش آئے۔ اگر پیدائش کے فوراً بعد چھڑا سانس لینا شروع نہ کرے تو

چھڑے کے منہ اور ناک سے رطوبتیں صاف کریں۔ چھڑے کو اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر باقی جسم سے نیچے ہو یا پچھلی ناگوں سے اٹھا

کر کچھ دیر اوپر نیچے کریں تاکہ منہ اور ناک سے رطوبتیں صاف ہو جائیں۔ سانس لینے کا عمل شروع کرنے کے لیے چھڑے کے نعتوں پر

تھکے سے گدگدی کریں یا اس کے سر پر شنڈا پانی بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

ناف کی صفائی: جب سانس لینے کا عمل بہتر ہو جائے تو چھڑوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اسکی ناف کو صاف کیا جائے۔ مثلاً

(Navel-joint-ii) ایک بیماری ہے جو ناف کی گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

توسیعی مواد برائے دودھ دینے والے جانور

ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE


اس مواد کی اشاعت ادارہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ بین الاقوامی ترقی (USAID) کے ذریعے امریکی عوام کے تعاون سے ممکن بنائی گئی ہے تاہم اس کے مندرجات کی ذمہ دار انٹرنیشنل میزرائینڈ ویٹ اپروومنٹ سنٹر (CIMMYT) اور اس کے پارٹنرز ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ USAID یا امریکی حکومت کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔

Hints on calf rearing

(نوزائیدہ بچھڑے پالنے کے لیے سفارشات) پہلے چار دنوں میں بوملی پلانا۔ تھنوں کی تبدیلی مثلاً کبھی ایک تھن سے دودھ تو کبھی دوسرے سے۔ اگر بائٹی سے دودھ پلانا مقصود ہو تو جسمانی وزن کے 10 فیصد حصہ کے حساب سے 5 تا 30 دن کیلئے پلائیں

Good Calf Management

Good calf housing with feed and water present at all times is important!!!!



Feeding colostrum (بوملی پلانے کی اہمیت)

بوملی: یہ وہ دودھ ہے جو گائے زچگی کے بعد تین یا پانچ دنوں تک دیتی ہے تقریباً پانچس فیصد بچھڑوں میں اموات کی وجہ بیماری سے مدافعت کا نہ ہونا ہے۔
☆ بوملی کی صحیح مقدار اور صحیح وقت پر استعمال بچھڑوں کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

☆ بوملی ایک گاڑھا پیلا مادہ ہے جو سونے والے جانور کے تھنوں سے بچھڑا پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے۔

☆ بوملی میں نمکیات، حیاتیات اور جراثیم کو ختم کرنے والے مادے (Antibodies) ہوتے ہیں جو بچھڑے کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر بوملی وقت پر پلائی جائے تو بچھڑوں کو دست لگ سکتے ہیں اور انکی موت واقع ہو جاتی ہے۔

☆ بوملی قبض کشا ہوتی ہے اور یہ نظام انہظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

☆ بچھڑے میں پیدائش کے 24 گھنٹے بعد بوملی جذب ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

☆ اگر بچھڑوں کو پیدائش کے پہلے 12 گھنٹوں میں بوملی ناپلائی جائے تو ان میں قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور بچھڑے مر جاتے ہیں۔

How much colostrum should be fed

بوملی کتنی مقدار میں پلائی جائے؟

بوملی کی مقدار بچھڑے کے معدے کے لحاظ سے زیادہ نہ ہو۔ تقریباً بچھڑے کو بوملی اسکے جسمانی وزن کے 5 فیصد کے حساب سے دینی چاہیے۔

مثلاً اگر بچھڑے کا وزن 40 کلوگرام ہو تو اسکو 2 کلوگرام بوملی پلائی چاہیے۔

When should colostrum be fed

(بوملی کب پلائی چاہیے)

پیدائش کے فوراً بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر پہلی خوراک پلائی چاہیے۔

دوسری خوراک 6 سے 9 گھنٹے کے اندر دینی چاہیے۔ بوملی سے پہلے کوئی خوراک نہیں دینی چاہیے۔

Do not leave the calf with the cow

(بچھڑے کو ماں سے الگ کرنا)

بچھڑے کو پیدائش کے فوراً بعد ماں سے الگ کر کے صاف ستھری اور خشک جگہ پر رکھنا چاہیے۔

بچھڑے کو ماں کے پاس دودھ لینے کے لیے تب چھوڑیں جب ماں کا حیوانہ صاف ہو۔ بچھڑے اور گائے میں اپنائیت بڑھنے سے بچھڑے کے اندر بوملی میں موجود جراثیم کو ختم کرنے والے مادوں کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔

☆ پیدائش کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے بوملی پلائیں اور اس عمل کو چاروں تک بار بار تکرار سے دہرائیں۔

☆ پہلے ماہ ایک تھن کا دودھ دیں ہر دفعہ تھن کو تبدیل کریں۔

☆ جب بائٹی سے دودھ پلانا مقصود ہو تو اس فیصد بلحاظ جسمانی وزن کا دودھ دیں (5-30 دن تک)

☆ بچھڑے کے معدے کی متوازن بڑھوتری کے لیے اعلیٰ قسم کے چارہ جات اور دھڑہ کھانا۔

☆ بچھڑے کو صاف اور تازہ پانی پلانا۔

☆ بچھڑے کو دودھ سے بچھڑانا Wean calves at

☆ پیدائش کے ایک مہینے بعد دودھ کی مقدار کم کریں، تقریباً جسمانی وزن کا 5% کے حساب سے دودھ دیں یا بتدریج دودھ پلانا کم کریں یہاں تک کے دودھ صونے سے پہلے اور بعد میں دیں۔

اگر بہترین چارہ اور دھڑہ اچھی مقدار میں دستیاب ہو تو 2 مہینے کی عمر میں دودھ بچھڑانا چاہیے۔

اگر درمیانی کوالٹی کا چارہ اور دھڑہ دستیاب ہو تو 4 مہینے بعد دودھ بچھڑانا چاہیے۔

اگر بُری کوالٹی والا چارہ اور دھڑہ دستیاب ہو تو 6 مہینے کی عمر میں دودھ بچھڑانا چاہیے۔