



Agricultural Innovation Program (AIP) for Pakistan

AIP-Livestock: Fact Sheet no: 10 (April, 2015)

دودھ دہنے کا عمل

تعارف

☆ حیوانے کی سوزش کی تشخیص کیلئے کپ میں دودھ کی چند دھاریں نکالیں اور دودھ کو دودھ دہنے والی جگہ سے دور پھینکیں چاہے دودھ صاف ہی کیوں نہ ہو یہ طریقہ تھن کی تالیوں کو ان چیزوں سے پاک کرنے کو یقینی بناتا ہے جو دودھ دہنے کے دوران ان تالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ معیاری دودھ کی پیداوار کا آغاز فارم پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے فارم کے دودھ میں کچھ بیکٹریا ہوں گے جو دودھ کو خراب کر سکتے ہیں اور یہ بیکٹریا بیماری کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ دودھ کے معیار اور صارف کی صحت کی حفاظت یقینی بنانے کیلئے آپ کو ہمیشہ دھھان صحت کے مطابق صاف جگہ پر دودھ دہنا چاہئے۔

مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

☆ گائیاں صاف اور صحت مند ہوں۔ بیمار جانور سے بیماری غیر معیاری دودھ کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔



☆ دودھ دہنے والی جگہ کو صاف، مٹی اور کچھڑ سے صاف رکھیں۔ دودھ دہنے والی جگہ پر گندگی اور گوبر کی وجہ سے چوہوں، بھئیوں اور لال بیک کو اپنی نسل بڑھانے کی جگہ مل جاتی ہے اور یہ مٹی اور بیکٹریا کو دودھ میں منتقل کرتے ہیں۔

☆ اگر آپ ناہیض یا اسہال جیسی متعدی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو گائے کا دودھ خود نہ دہیں اور اپنا علاج کروائیں اور تندرست ہونے کے بعد خود دودھ دہیں۔


☆ بوہلی (چھڑے کی پیدائش سے لے کر 7 دن تک پیدا ہونے والا دودھ) کو عام دودھ سے نہ ملائیں۔

☆ دودھ دہنے سے پہلے اپنے ہاتھ صابن اور صاف پانی سے دھوئیں۔



Wash hands with soap and clean water

☆ حیوانے کو کپڑے اور نیم گرم پانی سے دھوئیں اور صاف خشک کپڑے سے خشک کریں۔



☆ دودھ دہنے کیلئے صاف اسٹین لیس اسٹیل کی بائی استعمال کریں۔ گندہ برتن دودھ دہنے کیلئے استعمال نہ کریں۔ جیسا کہ دائیں طرف بتایا گیا ہے۔



☆ حیوانے کی سوزش میں مبتلا گائیوں کا دودھ سب سے آخر میں دوہیں اور پھر ضائع کر دیں۔

☆ جن گائیوں کا علاج جراثیم کش ادویات سے کیا جا رہا ہو ان کے دودھ کو آخری بار دوہائی دینے کے 3 دن بعد تک نہ تو فروخت کرنا چاہئے اور نہ ہی پینے کیلئے استعمال کرنا چاہئے یا موسیقیوں کے معالج کی حمایت پر عمل کرنا چاہئے۔

توسیع مواد برائے دودھ دہنے والے جانور



اس مواد کی اشاعت ادارہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ بین الاقوامی ترقی (USAID) کے ذریعے امریکی عوام کے تعاون سے ممکن بنائی گئی ہے، تاہم اس کے مندرجات کی ذمہ دار انٹرنیشنل میڈیٹریٹ ویٹ ایپر وومینٹ سنٹر (CIMMYT) اور اس کے پارٹنرز ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ USAID یا امریکی حکومت کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔

☆ دودھ کو صاف اور خشکی جگہ پر رکھیں۔

☆ دودھ دونے کے بعد تھنوں کو جراثیم کش محلول میں ڈبونا چاہئے۔ سر کے کاہک محلول ایک اچھا متبادل ہے۔




☆ دودھ دونے کے دوران دودھ دونے والے کو مندرجہ ذیل چیزیں نہیں کرنی چاہئیں۔

- ۱۔ ناخن لمبے رکھنا
- ۲۔ چھینکنا
- ۳۔ تھونکا
- ۴۔ کھانا
- ۵۔ سگریٹ پینا


دودھ کو سائے کے نیچے کسی صاف جگہ پر رکھیں




دودھ کے ڈبے کو کھنڈر سے پانی میں رکھیں، بہتر یہ کہ پتے ہوئے پانی میں رکھیں



☆ دودھ دونے کے بعد جالی یا کپڑے سے چھان لیں تاکہ اس دوران گرنے والے ٹھوس اجزاء کو نکالا جاسکے۔



☆ دودھ کو گندمی سے بچانے کیلئے ڈھانپ کر رکھیں۔



دودھ کے ڈبے کو گیلے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھ لیں

