



Agricultural Innovation Program (AIP) for Pakistan

AIP-Livestock: Fact Sheet no: 03

(چھتری کی نگہداشت اور دیکھ بھال)

- ☆ اچھی دیکھ بھال سے گائے 15-20 ماہ اور بھینس 21-25 ماہ کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں۔
- ☆ 24-30 ماہ کی عمر میں پچھلے لٹا اور پھر دودھ کی اچھی پیداوار لیتا۔
- ☆ ویگ میں دوبارہ آنا اور زچگی کے 70-80 دنوں کے اندر دوبارہ ملاپ کروانا۔

Target weights (kg) for helpers (good management)		
	Buffalo	Cattle
Birth weight	26-31	30-35
At puberty	270-300	220-270
To become pregnant at	300-325	270-310

(Heifer Growth Nutrition) (جوان چھتری کی بڑھوتری اور خوراک)

- چھتریوں کی صحیح نگہداشت کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انکی بلوغت پر پہنچنے پر توجہ دی جائے۔
- ملائی کا پہلا مرحلہ جب گائے کی چھتری بالغ گائے کے وزن کا 40 تا 60 فیصد اور بھینس کی چھتری بالغ بھینس کے وزن کا 50 تا 70 فیصد حاصل کرنے پر شروع ہوتا ہے۔
- ☆ اچھی خوراک پر پلنے والے مادہ جانور عام طور پر 11-15 ماہ میں گائے اور 17-21 ماہ کی عمر میں بھینس بالغ ہو جاتی ہے۔ مناسب دیکھ بھال کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ان عمروں میں مادہ جانور بالغ نہیں ہو پاتے، جوان مادہ جانور جن کا وزن کم ہوتا ہے بہت کم حاملہ ہوتی ہیں ان جانوروں میں پہلی زچگی کے دوران دودھ میں کم چکنائی ہوتی ہے اور دوبارہ ملاپ کے بعد حاملہ ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔

Breeding soon after heifer reaches puberty would result in poor performance in subsequent lactations.

عموماً، جوان چھتری کو (Heifer) کہتے ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں جب مادہ چھتری کو دودھ ٹھہرایا جائے تو اسے (Heifers) کہتے ہیں۔ چھتریوں کی نگہداشت ڈیری فارم کے انتظامی امور کا بہت اہم حصہ ہے۔ آج کی چھتری کل کی گائے ہوتی ہے۔ دوسرے معنوں میں چھتریاں گائے بن کر زمیندار کے لیے آمدن اور دولت کا ذریعہ بنتی ہیں۔

☆ جانور پالنے والے کسان جنھوں نے مادہ چھتریاں نہ پالی ہوں ان کو اپنے ریوڑ کی ضروریات مادہ چھتریاں خرید کر پوری کرنی پڑتی ہے نئی خریدی جانے والی مادہ چھتریاں موروثی طور پر پرانی گائیوں کی نسبت اعلیٰ نسل کی ہو سکتی ہیں لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے کیونکہ خریدی جانے والی مادہ چھتریوں کی صحت کا اکثر پتہ نہیں ہوتا اور ریوڑ میں نئی بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔

چھتریاں پالنے میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً جوان چھتری کی دیکھ بھال ضروری ہے کیونکہ گائے کے دودھ کی پیداوار کا انحصار گائے کے (بچے) چھتری پیدا کرنے کی تعداد پر ہے۔ اگر پہلا چھترا چھوٹی عمر میں پیدا ہو جائے تو اسکی نشوونما روک جاتی ہے۔ پہلا چھترا پیدا کرنے اور دودھ چھترانے کا دورانیہ غیر پیداواری دور نہیں ہونا چاہیے

جوان چھتریوں کو پالنے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے

☆ جوان جانوروں میں نشوونما کے لئے خوراک کو بہتر طور پر استعمال کرنا اور بہتر خوراک کو دودھ کی پیداوار کی بجائے نشوونما کے لئے بہتر کارگرگی سے استعمال کرنا چاہیے

☆ چھتریوں سے نسل کشی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بچے لینا

جوان چھتریوں کی خوراک، صحت، دیکھ بھال اور نشوونما کیلئے مندرجہ ذیل ضروریات پوری ہونی چاہیے۔

☆ چھترے کے شرح اموت میں کمی۔

☆ جلدی بلوغت میں پہنچنا۔ گائے کی چھتری 12-13 مہینوں میں اور بھینس کی چھتری (17-21) مہینوں میں۔

توسیع مواد برائے دودھ دینے والے جانور

Feeding From Breeding to Calving

(ملاپ سے لے کر زچگی تک خوراک)

چھڑیوں کا معدہ تقریباً 13 مہینے کی عمر میں پوری طرح کارآمد ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اچھی قسم کے چارہ جات ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چھڑیوں کو اعلیٰ قسم کے چارہ جات کھلانا چاہیے اور خاص کر زچگی سے دو مہینے قبل اسکو اچھی کوالٹی کا ونڈا اور توانائی سے بھرپور خوراک دینی چاہیے۔

حاملہ چھڑی کی جسمانی صحت کا درجہ 3 ہونا چاہیے یہ جانور کو پہلی دفعہ دودھ دینے کے دوران دباؤ اور تختیوں سے کچھ حد تک محفوظ رکھتی ہے کیونکہ اس دوران جانور نے دودھ بھی دینا ہوتا ہے اور نشوونما کو بھی جاری رکھنا ہوتا ہے اور زچگی کے دو ماہ بعد دوبارہ ویک میں آنے کے قابل بناتا ہے کمزور اور موٹی جوان چھڑیوں میں زچگی کے دوران اور زچگی کے بعد مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جوان چھڑی کے حاملہ ہونے پر نشوونما کی کمی کی وجہ سے مندرجہ ذیل نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔

- ☆ نوزائیدہ چھڑے کو اچھی غذائیت والی خوراک کا نہ ملنا۔
- ☆ چھڑے کی نامناسب نشوونما کی وجہ سے پیدائش میں دشواری
- ☆ پہلی دفعہ دودھ دینے کے دورانیے میں دودھ کی پیداوار کم ہونا۔


Some guidelines on weights (kg) to breed pure and crossbreds:

Friesians, Friesian x Brown Swiss	- 300
Friesian x zebu crosses	- 275
Buffalo	- 300

جری اور فریزن نسل کے جانوروں میں مختلف عمروں میں مقرر کردہ جسمانی وزن حاصل کرنے کیلئے 450 تا 550 گرام وزن یومیہ بڑھنا ضروری ہے۔ اگر گائے کی جوان چھڑی کی نشوونما اطمینان بخش ہو تو وہ 12 ماہ کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے اور 14-15 ماہ کی عمر میں ملاپ کیلئے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر جوان چھڑی مقررہ کردہ جسمانی وزن نہ حاصل کر سکے تو پھر پیدا کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر 24 ماہ کی عمر تک مقرر کردہ جسمانی وزن نہ حاصل ہو سکے تو کئی جانوروں میں پہلی زچگی کے بعد دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے

غیر معیاری خوراک کی وجہ سے نشوونما میں کمی ان اہم اثرات کو ظاہر کرتی ہے کم وزن والی جوان چھڑیوں کو تھوڑے عرصے کے لئے اچھی کوالٹی کا ونڈا کھلانا مناسب ہے تاکہ پچھلی خوراک کی کمی کے اثرات پر تاقاب پایا جاسکے۔

When high quality feeds are difficult to produce, rearing pure or crossbred heifers with **abundant, low quality feeds** may result in **slow growth rates** (400-500 g/day) and delayed first calving, but this might be **most economical rearing strategy for such situations!!**



Source: Dairy Essentials, Raising Dairy Heifers babcock@calshp.cals.wise.edu

(m.ibrahim@cgiar.org) کے لئے محمد ابراہیم کا ای میل (AIP-ILRI کی مزید تفصیلات کے لئے)